

Bewaring

Ongeopend tot 6 maanden op kamertemperatuur onder de 25°C.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Constipatie
- Diarree
- Misselijkheid
- Maagklachten
- Winderigheid (flatulentie)

Deze hebben de neiging om mild tot matig van aard te zijn en lossen zich over het algemeen vanzelf of met een behandeling opgestart door uw arts op. Als u bijwerkingen ondervindt, zorg er dan voor dat u Veltassa® zeker met voedsel inneemt, bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.

Vragen of problemen?

Bel onze **hartfalenverpleegkundigen**:

Barbara Vande Kerckhove: 09 246 86 40

Katrien De Clercq: 09 246 86 41

HARTCENTRUM



AZ MARIA MIDDELAERES

Buitenring Sint-Denijs 30
9000 GENT
Telefoon: 09 246 86 00
Email: info@hartcentrum.be

AZ SINT-VINCENTIUS

Schutterijstraat 34
9800 DEINZE
Telefoon: 09 387 70 61

Veltassa®



Waarom te nemen?

U kreeg Veltassa® (patiomer) voorgeschreven om uw bloedkaliumgehalte te verlagen.

Kalium is van essentieel belang voor de goede werking van uw lichaam gezien het zorgt voor een goed functioneren van uw hart, spieren en zenuwen. U haalt kalium uit uw voedsel. Als u meer kalium eet dan uw lichaam nodig heeft, verwijderen de nieren een deel ervan en brengen het weer op het normale niveau. Te veel kalium in het bloed is gekend als een hoge kaliumspiegel of hyperkaliëmie.

Symptomen van een hoge kaliumspiegel (hyperkaliëmie):

- Zich erg moe voelen
- Misselijkheid (nausea)
- Dof of tintelend gevoel (in de handen, benen en/of andere lichaamsdelen)
- Niet kunnen bewegen (paralyse)
- Pijn op de borst
- Hartkloppingen of overgeslagen hartslagen

Indien onbehandeld, kan hyperkaliëmie in ernstige gevallen hartritmestoornissen en spierverslaving veroorzaken. Soms worden bij hyperkaliëmie geen symptomen waargenomen, dus is het belangrijk om Veltassa® in te nemen zoals voorgeschreven door uw arts.

Hoe in te nemen?



MENGEN

Doe ongeveer 40 ml water in een glas. Voeg alle poeder van het vereiste aantal zakjes toe. Roer het mengsel goed door elkaar. Het lost niet op, u ziet misschien wel wat vaste deeltjes in de vloeistof.



TOEVOEGEN

Voeg ongeveer 40 ml water toe. Roer opnieuw. U kunt meer water toevoegen als het mengsel te dik is.



DRINKEN

Drink het meteen op. Als er wat poeder in het glas achterblijft, voeg dan meer water toe. Drink alle medicatie in het glas op.



Neem Veltassa® samen met eten in

Als u uw Veltassa® steeds bij dezelfde maaltijd gebruikt, zal u er gemakkelijker aan denken om het elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen.

Neem het Veltassa®-poeder **NIET** droog in.

Meng het steeds met water

Gebruik **GEEN** warm water om Veltassa® te mengen.

NIET verhitten, opwarmen in de microgolf of toevoegen aan warme voedingsmiddelen of vloeistoffen.

Meng Veltassa® **NIET** in een blender.

Stop de medicatie niet plots zonder overleg

met uw arts !

3 uur

U moet tijd laten tussen Veltassa® en uw andere medicatie, omdat dit anders de goede werking van uw andere medicatie kan beïnvloeden.

Neem Veltassa® **3 uur vóór of 3 uur na uw andere medicatie.**

Als u uw dosis vergeet te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk dezelfde dag nog in.

Neem het niet in met uw volgende dosis.

Uw arts of apotheker kan u helpen bij het opstellen van een schema.